

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران جداً خودداری نمایید.

راهنمایی های عمومی

- ۱- در صورت حساسیت به استامینوفن، آسپیرین، مواد دیگر، غذاها، مواد محافظ و رنگ ها پزشک را مطلع سازید.
- ۲- مصرف این دارو در کودکان مطالعه شده است و عوارض جانبی متفاوتی با بزرگسالان مشاهده نشده است ولی مصرف برخی از محصولات استامینوفن مخصوص کودکان که حاوی آسپارتام می باشند ممکن است در کودکان مبتلا به فنیل کتون اوری خطرناک باشد.
- ۳- مصرف این دارو در سالمندان مطالعه شده است و بروز عوارض جانبی متفاوتی با سایر گروه های سنی گزارش نشده است.
- ۴- در صورت مصرف همزمان سایر داروهای بدون نسخه (OTC) و یا با نسخه به خصوص آسپیرین و دیگر سالیسیلات ها، دیکلوفناک، دی فلونیسال، اتودولاک، فنوپروفن، فلوکتافین، فلوربی پروفن، ایبوپروفن، ایندومتاسین، کتوپروفن، کتورولاک، مکلوفناتام، مگنمیک اسید، نابومتون، ناپروکسن، اکسا پروزین، فنیل بوتازون، پیروکسیکام، سولینداک، تنوکسیکام، تیاپروفنیک اسید، تولمتین پزشک را مطلع سازید.
- ۵- در صورت ابتلا به بیماری های کلیوی، هیپاتیت و سایر بیماری های کبدی و فنیل کتونوری اوری پزشک را مطلع سازید.
- ۶- دارو را بیش از مقدار تجویز شده مصرف نکنید زیرا مصرف طولانی مدت و یا بیش از مقدار تجویز شده سبب آسیب به کلیه و کبد می شود.
- ۷- کودکان زیر ۱۲ سال نباید دارو را بیش از ۵ بار در روز مصرف کنند مگر آنکه پزشک تجویز کرده باشد.

مصرف در بارداری و شیردهی

بارداری:

با وجودی که مصرف این دارو در زنان باردار مطالعه نشده است ولی گزارشی مبنی بر ایجاد نقص جنینی توسط مصرف این دارو در زنان باردار مشاهده نشده است. در صورت بارداری یا احتمال آن پزشک را مطلع سازید.

شیردهی:

با وجودی که استامینوفن به مقدار کم در شیر مادر ترشح می شود ولی مشکلی در نوزاد تازه به دنیا آمده ایجاد نمی کند.

موارد احتیاط

- ۱- در صورتی که دارو را برای کاهش دردی مثل درد آرتریت مصرف می کنید و درد به مدت بیشتر از ۱۰ روز در بزرگسالان و به مدت بیش از ۵ روز در کودکان ادامه پیدا کرد، تشدید و یا علائم جدید ایجاد شد، منطقه دردناک قرمز و یا متورم شد، پزشک یا دندان پزشک را مطلع سازید.
- ۲- در صورتی که دارو را برای کاهش تب مصرف می کنید و تب برای بیش از ۳ روز ادامه پیدا کرد، تشدید و یا علائم جدید ایجاد شد، التهاب و یا تورم دیده شد پزشک یا دندان پزشک را مطلع سازید.
- ۳- در صورتی که دارو را برای کلودرد استفاده می کنید و گلو درد بیش از ۲ روز ادامه پیدا کرد و بسیار دردناک شد و علائمی مثل تب و سردرد، بثورات پوستی، تهوع و استفراغ بروز کرد به پزشک مراجعه کنید.
- ۴- ممکن است این دارو در نتیجه بعضی از آزمایشات پزشکی تداخلاتی ایجاد کند. لذا قبل از انجام هر آزمایش پزشکی، در صورت مصرف استامینوفن در طول ۳ تا ۴ روز گذشته مسئول مربوطه را در جریان بگذارید. چنانچه مقدور است ۴ روز قبل از انجام آزمایش خود، با آزمایشگاه تماس گرفته و درباره مصرف این دارو در روز قبل از انجام آزمایش سؤال کنید.

بیماری دیابت شما به خوبی کنترل شود.

۶- در صورت مصرف بیش از حد این دارو توسط شما و یا هر فرد دیگری حتی اگر آثار مسمومیت را مشاهده نکردید فوراً به پزشک مراجعه کنید. ممکن است علائم مصرف بیش از حد ۲ تا ۴ روز بعد از مصرف مشاهده نشود ولی درمان برای جلوگیری از آسیب کبدی و مرگ باید هرچه زودتر آغاز شود. در صورتی که درمان ۲۴ ساعت بعد از مصرف بیش از حد آغاز شود ممکن است موثر واقع نشود.

۸- در صورت مصرف همزمان داروهای دیگر حاوی استامینوفن با این دارو پزشک را در جریان قرار دهید، ممکن است مسمومیت با استامینوفن ایجاد شود.

مقدار و نحوه مصرف

مقادیر ذکر شده در زیر مقدار متوسط مصرف است و مقدار دقیق را پزشک تعیین می کند.

برای درد و تب :

- بزرگسالان و نوجوانان : ۳۲۵ تا ۵۰۰ میلی گرم هر ۳ تا ۴ ساعت ، ۶۵۰ میلی گرم هر ۴ تا ۶ ساعت یا ۱ گرم هر ۶ ساعت در صورت نیاز یا ۱۳۰۰ میلی گرم هر ۸ ساعت. حداکثر مقدار مصرف نباید بیش از ۴ گرم در روز باشد.
- کودکان (مقدار مصرف بر اساس سن تعیین می شود):
- نوزادان تا ۳ ماه : ۴۰ میلی گرم هر ۴ ساعت بر حسب نیاز.
- نوزادان ۴ تا ۱۲ ماه : ۸۰ میلی گرم هر ۴ ساعت بر حسب نیاز.
- کودکان ۱ تا ۲ سال : ۱۲۰ میلی گرم هر ۴ ساعت بر حسب نیاز.
- کودکان ۲ تا ۴ سال : ۱۶۰ میلی گرم هر ۴ ساعت بر حسب نیاز.
- کودکان ۴ تا ۶ سال : ۲۴۰ میلی گرم هر ۴ ساعت بر حسب نیاز.
- کودکان ۶ تا ۹ سال : ۳۲۰ میلی گرم هر ۴ ساعت بر حسب نیاز.
- کودکان ۹ تا ۱۱ سال : ۴۰۰ میلی گرم هر ۴ ساعت بر حسب نیاز.
- کودکان ۱۱ تا ۱۲ سال : ۳۲۰ تا ۴۸۰ میلی گرم هر ۴ ساعت بر حسب نیاز.

عوارض جانبی

هر دارو به موازات اثر درمانی مطلوب ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته نیز بشود. اگرچه تمام این عوارض در یک فرد دیده نمی شود لیکن در صورت بروز هر کدام از عوارض زیر فوراً با پزشک مشورت کنید.

موارد نادر:

زردی چشم ها و صورت.

در صورت بروز عوارض جانبی زیر در اولین فرصت به پزشک مراجعه کنید: موارد نادر :

مدفوع خونی، تیره و قیر مانند، ادرار خونی یا کدر، تب همراه یا بدون لرز (قبل از درمان یا در طول آن ایجاد نشده باشد)، درد در قسمت تحتانی پشت و پهلو (شدید)، لکه های ریز قرمز رنگ روی پوست ، راش پوستی، کهیر، خارش، زخم و درد یا لکه های سفید روی لب ها یا داخل دهان، گلو درد (قبل از درمان یا در طول آن ایجاد نشده باشد) ، کاهش ناگهانی در مقدار ادرار، خونریزی یا کبودی غیر عادی، خستگی و ضعف غیر عادی.

عوارض مصرف بیش از حد:

اسهال، افزایش تعریق ، کاهش اشتها، حالت تهوع یا استفراغ، درد یا ناراحتی معده، تورم، درد یا حساسیت در قسمت فوقانی شکم و معده.

شرایط نگهداری

- ۱- دور از دید و دسترس کودکان نگهداری نمایید.
- ۲- دور از نور، رطوبت و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد نگهداری نمایید.
- ۳- از مصرف و نگهداری داروی تاریخ گذشته خودداری کنید.

شکل عرضه

این دارو به صورت قرص های گرد سفید خط دار حاوی ۳۲۵ میلی گرم استامینوفن و قرص های لوبیایی شکل سفید رنگ حاوی ۵۰۰ میلی گرم استامینوفن و کپسول نرم ۵۰۰ میلی گرم در شرکت تهران دارو تولید و عرضه می گردد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر ، طرح سوال و در صورت بروز عارضه دارویی