

Vitamin E - Tedagel**Vitamin E****مکمل رژیمی - غذایی**

این دارو برای درمان بیماری فعلی شما تجویز گردیده است. لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران خودداری نمایید.

راهنمایی های عمومی

۱- در صورت حساسیت به این دارو، غذاها، رنگ‌ها، سایر داروها و حیوانات پزشک را مطلع سازید.

۲- گزارشی مبنی بر بروز عوارض ناخواسته در کودکانی که دوز معمول روزانه را مصرف می‌کنند مشاهده نشده است. در تعدادی مطالعات نشان داده شده است که نوزاد نبالغ دچار کمبود ویتامین ای است که در این صورت پزشک ممکن است ویتامین ای پیشنهاد بدهد.

۳- گزارشی مبنی بر بروز عوارض ناخواسته در سالمندانی که دوز معمول روزانه از این دارو را مصرف می‌کنند مشاهده نشده است.

۴- در صورت مصرف سایر مکمل‌های غذایی و داروها به خصوص دیکومارول همزممان با این دارو پزشک را مطلع سازید.
۵- در صورت ابتلا به بیماری‌های دیگر مانند خونریزی پزشک را مطلع سازید.

۶- رژیم غذایی متعادل و متنوع به سلامتی بدن کمک می‌کند. برای اینکه به مقدار کافی ویتامین و مواد معدنی به بدن شما برسد درباره رژیم غذایی مناسب از پزشک یا داروساز خود کمک بگیرید.

۷- در صورتیکه یک نوبت از مصرف این دارو را فراموش کردید، آن را مصرف ننموده و دوز بعدی را دو برابر نکنید و به درمان به طور معمول ادامه دهید.

صرف در بارداری و شیردهی**شیردهی**

اطلاعاتی در مورد ترشح ویتامین ای در شیر در دسترس نیست اما چون بسیاری از داروها در شیر ترشح می‌شوند توصیه می‌شود در صورت شیردهی پزشک را مطلع کنید.

مقدار و نحوه مصرف

مقادیر ذکر شده در زیر مقدار متوسط مصرف است و مقدار دقیق را پزشک تعیین می‌کند.

پیشگیری از کمبود ویتامین ای

- زن باردار : روزانه ۱۶۷ واحد.
- زن شیرده : روزانه ۱۸ تا ۲۰ واحد.
- کودکان ۱۰ تا ۱۰ ساله : روزانه ۱۱۷ واحد.
- نوزادان (از هنگام تولد تا ۳ سالگی) : روزانه ۵ تا ۱۰ واحد.

درمان کمبود ویتامین ای
صرف و مقدار آن توسط پزشک تعیین می‌شود.

عوارض جانبی

هر دارو به موازات اثر درمانی مطلوب ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته نیز بشود. اگرچه تمام این عوارض در یک فرد دیده نمی‌شود لیکن در صورت بروز هر کدام از عوارض زیر در اولین فرستت با پزشک مشورت کنید.

صرف طولانی مدت و بیش از ۴۰ واحد در روز :
تاری دید، اسهال، گیجی، سردرد، معده درد یا شکم درد، خستگی غیرعادی یا ضعف.

شرایط نگهداری

- ۱- دور از دید و دسترس کودکان نگهداری نمایید.
- ۲- دور از نور و رطوبت و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی‌گراد نگهداری نمایید.
- ۳- از مصرف و نگهداری داروی تاریخ گذشته خودداری کنید.

شكل عرضه :

این فرآورده بصورت کپسول‌های ژلاتینی نرم حاوی ۶۰۰ واحد ویتامین ای و همچنین کپسول‌های ژلاتینی نرم حاوی ۴۰۰ واحد ویتامین ای و همچنین کپسول‌های ژلاتینی نرم حاوی ۱۰۰ واحد ویتامین ای در شرکت داروسازی تهران دارو تولید و عرضه می‌گردد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر، طرح سوال و در صورت بروز عارضه دارویی خاص پس از مصرف دارو با واحد علمی شرکت تهران دارو با شماره تلفنی ۰۱۸-۱۸۹۰۵۰۱۶ تماس حاصل فرمائید.

**پیشگیری از کمبود ویتامین ای**